

## PROVEEDORES DE NALOXONA

Buscar centros de distribución en todo el Estado  
[www.nvopioidresponse.org](http://www.nvopioidresponse.org)

### Agencias de reducción de daños

**Change Point**  
445 Ralston Street, Reno, NV 89503  
775-997-7519

**Trac-B Exchange**  
6114 W Charleston Blvd., Las Vegas, NV 89146  
702-840-6693

**Proveedores de tratamiento**  
[www.behavioralhealthnv.org](http://www.behavioralhealthnv.org)

El precio promedio en efectivo  
del aerosol nasal NARCAN en  
Nevada es de \$75-\$145

El aerosol nasal NARCAN está  
cubierto por NV Medicaid

Para obtener ayuda inmediata para servicios  
de crisis de salud conductual, llame o  
envíe un mensaje de texto al 988.

# Seguridad de los opioides y cómo utilizar la naloxona



*Este proyecto fue financiado en su totalidad o parcialmente por la Oficina de salud conductual, prevención y bienestar de la división de salud pública y conductual de Nevada a través de la financiación proporcionada por la Subvención de la administración de servicios de salud mental y abuso de sustancias para la respuesta del Estado de Nevada a los opioides.*



**NEVADA STATE**  
Opioid Response - An STR/ SDR Project



## ¿Qué es un opiode y cómo puede producirse una sobredosis?

Los opiodes incluyen drogas ilícitas como la heroína o medicamentos recetados para tratar el dolor como la oxycodona, la hidrocodona y el fentanilo. Una sobredosis de opiodes puede producirse cuando se toman demasiados opiodes a la vez o se mezclan con otras drogas y la respiración se ralentiza o se detiene.



### Para evitar una sobredosis accidental de opiodes:

- Evite mezclar sus opiodes con alcohol, benzodiazepinas (Xanax, Ativan, Klonopin, Valium) o medicamentos que le produzcan sueño.
- Extreme las precauciones, si omite o cambia una dosis, si se encuentra mal o si empieza a tomar nuevos medicamentos.



### Cómo identificar una sobredosis de opiodes:

Observe estos signos comunes:

- La persona no se despierta ni responde a la voz o al tacto.
- La respiración se ralentiza o incluso se detiene.
- Los labios y las uñas se vuelven azules o grises.



### En caso de sobredosis:

1. Llame al 911 y administre naloxona.
2. Realice respiración artificial o compresiones torácicas
  - Compruebe que las vías respiratorias están despejadas.
  - Si están obstruidas, gírelo sobre un lado y haga un barrido con los dedos para despejarlas.
  - Gírelo hacia atrás, inclínele la cabeza hacia atrás y apriete la nariz.
  - Dele 2 respiraciones regulares.
  - Si sigue sin respirar por sí mismo, dele 1 respiración cada 5 segundos.
  - Continúe con la respiración artificial o las compresiones torácicas hasta que la persona se reanime o llegue la ayuda.
  - Cuando la persona empiece a respirar por sí misma, colóquela en posición de recuperación. Recuerde seguir dándole respiración hasta que la persona sea capaz de respirar por sí misma.
3. Colóquelo en posición de recuperación:
  - Coloque a la persona de lado, con el brazo por encima de la cabeza.
  - Coloque la rodilla y los brazos por encima del cuerpo de la persona para mantenerla de lado. Esto ayudará a evitar que se ahogue si vomita. Una vez administrada la naloxona, permanezca con la persona durante al menos 3 horas o hasta que llegue la ayuda.

## Cómo administrar el aerosol nasal NARCAN:

**Paso 1:** Saque el aerosol nasal NARCAN de la caja y retire la pestaña para abrirlo.



**Paso 2:** Sostenga el aerosol nasal NARCAN con el pulgar en la parte inferior del émbolo y el dedo índice y medio a cada lado de la boquilla.



**Paso 3:** Inserte la punta de la boquilla en cualquiera de las fosas nasales hasta que los dedos de ambos lados de la boquilla toquen el fondo de la nariz de la persona. Inclínele la cabeza de la persona hacia atrás y brinde apoyo con la mano debajo del cuello.



**Paso 4:** Presione firmemente el émbolo para administrar toda la dosis en una fosa nasal.



**Paso 5:** Si no hay reacción o esta es mínima en 2 o 3 minutos, repita la operación con un nuevo aerosol nasal NARCAN en la otra fosa nasal.

La **Ley del Buen Samaritano de Nevada** ofrece protección contra la detención a las personas que buscan asistencia médica para una persona que experimenta una sobredosis de drogas o alcohol y el individuo que experimentó la sobredosis.

*No se ofrece protección contra la detención por cargos relacionados con posesión con intención de vender/distribuir, negligencia/peligro de menores o para personas con órdenes de detención activas.*

**Ahora que tienes naloxona...  
Dígale a alguien dónde está y cómo usarla.**